



Вирус энцефалита в козьем молоке!

Козье молоко — диетический продукт, который обладает высокой лечебной ценностью, прежде всего рекомендован детям, страдающим аллергией. От коровьего молока отличается по составу белков и жиров. Жиры из козьего молока усваиваются легче. Из-за разницы в структуре белков козье молоко реже вызывает аллергию. Однако может привести к опасным инфекционным заболеваниям, одним из которых является **клещевой энцефалит**.

В сезон клещей сырое молоко по-настоящему опасно! Козы заражаются клещевым энцефалитом от клещей. Употребление от таких животных молока и молочных продуктов на его основе в некипяченом виде сопряжено с высоким риском заражения **клещевым энцефалитом**.

Вирус клещевого энцефалита попадает в молоко после присасывания к животному зараженного клеща. Как правило, у коз инфекция протекает бессимптомно, однако вирус циркулирует в крови животного и **выделяется с молоком**. В крови вирус находится около трёх дней, а в молоке 8 дней после заболевания. Полностью исключить риск заражения клещевым энцефалитом можно путем кипячения этого продукта — при температуре 100 градусов Цельсия вирус клещевого энцефалита погибает мгновенно.

Настоятельно рекомендуем в обязательном порядке кипятить любое потребляемое молоко.

Государственная ветеринарная служба Калининградской области

Телефон горячей линии 8(4012)527299